

Um animal: um mamífero - Desmão dos Pirinéus ou Toupeira de Água (*Galemys pyrenaicus* É.Geoffroy, 1811)

A toupeira-de-água parece ser o mamífero mais estranho e raro da fauna portuguesa. Entre nós, é conhecido como toupeira-da-água, rato-papialvo, rato-de-bico-comprido e rato-almiscareiro.

Aspectos morfológicos principais:

Pertence à ordem *Insectivora* e à família *Talpidae*.

Evidencia algumas características adap-

tadas à vida aquática. O seu corpo é fusiforme, sem pescoço definido, focinho em forma de tromba e vibrissas com uma mobilidade impressionante. Olhos pequenos, com fraco sentido de visão. Não tem pavilhões auriculares, mas o seu sentido de audição é grande. E o do olfacto também. As patas anteriores são pouco desenvolvidas, com unhas fortes. As posteriores são espalmadas, robustas, com membrana interdigital. Apresenta uma cauda longa e achatada. Na sua densa pelagem (bastante oleosa, devido à acção de glândulas sebáceas, que criam uma protecção impermeável contra a água e o frio) surgem reflexos brilhantes no dorso, entre o castanho-escuro e o negro. No ventre, a cor é clara. Mede 12 cm e pesa cerca de 60 gr. Nada rapidamente mas, no solo, revela algumas dificuldades de locomoção. O seu período de longevidade é de 3 a 4 anos.

Hábitos alimentares: Animal solitário e esquivo, alimenta-se durante a noite, embora também o faça, por alguns momentos, durante o dia. Procura as presas na água: larvas de mosquitos, crustáceos e pequenos vertebrados.

Faz curtas pausas nas margens, para comer os animais capturados. Quando se sente ameaçado, solta guinchos agudos.

Habitat: Os pequenos cursos de água montanhosos, de água fria, limpa e bem oxigenada, são os habitats mais característicos da toupeira-de-água. Os cursos de água com margens rochosas e grandes pedras emersas são também escolhidos por esta espécie.

Reprodução: Na época da reprodução, os machos marcam o território com listas pretas, produzidas pela glândula subcaudal. Os acasalamentos ocorrem entre Janeiro e Maio. Formam casais duradouros, juntos, defendem o seu território, embora sejam muito agressivos um com o outro. Fazem o ninho à beira dos rios, utilizando buracos naturais e tocas abandonadas de outros mamíferos. As crias nascem após 4 a 5 semanas de gestação, em ninhadas de 4 ou 5 indivíduos. Atingem a maturidade sexual com 1 ano de idade. Só as fêmeas cuidam das crias.

Distribuição: A toupeira-de-água pode ser encontrada nos Pirenéus, em algumas zonas do Norte e Centro de Portugal (Minho, Trás-os-Montes e Beiras) e em algumas províncias espanholas, também em zonas do Norte.

