

## Um animal: um mamífero

### Saca-rabos (*Herpestes ichneumon* L)

O saca-rabos, também chamado **mangusto**, **manguço** ou **escalavardo**, é um mamífero que até 1993 pertencia à família dos Viverrídeos (com a Geneta) e que agora integra uma família própria: a dos Herpestídeos.

É um animal de difícil visualização, apesar dos seus hábitos diurnos, pois tem um comportamento bastante esquivo, o que dificulta a sua observação.

**Aspectos morfológicos principais:** É um carnívoro de porte médio. O comprimento da cabeça e tronco ronda os 50 a 55 cm, a cauda, 33 a 50 cm e o peso anda pelos 1,9 a 4 kg. Tem uma pelagem comprida, castanho-acinzentada, o focinho é pontiagudo, as patas curtas, a cauda é larga na base e afunila até à sua extremidade onde se nota um pincel de pêlos mais escuros. As orelhas são muito curtas e arredondadas. Os olhos, entre o castanho e o amarelo, têm pupila horizontal, o que não é muito comum em mamíferos carnívoros.

**Hábitos alimentares:** Muito variados. Alimenta-se sobretudo de roedores e também de coelhos e lebres. Os seus reflexos muito rápidos permitem-lhe capturar répteis, batráquios, insectos, crustáceos e peixes. Também não rejeita frutos e ovos. Estes parte-os arremessando-os contra as rochas.

**Habitat:** Refugia-se em terrenos rochosos com vegetação densa. Surge com mais frequência nas regiões mais quentes de Portugal, o Alentejo e o Algarve, embora se tenha expandido nas últimas décadas, mais para Norte, sobretudo pelo interior. Alguns exemplares já foram vistos a norte do rio Douro, talvez devido a grandes mudanças na prática da agricultura, nas últimas 3 décadas.



**José Sousa**

**Reprodução:** A época do cio é pouco conhecida. É sabido que no Sul da Península Ibérica já ocorreram nascimentos em Fevereiro e entre Maio e Setembro. A gestação dura entre 72 a 88 dias. Criam uma ninhada por ano, com 2, 4 ou 6 crias que nascem com cerca de 70 gr e têm o corpo coberto de pêlos, excepto no abdómen. Com 3 meses já acompanham a progenitora na caça. Embora poligâmico, podendo fecundar várias fêmeas, o progenitor participa nos cuidados parentais. O macho é um pouco maior que a fêmea, mas o dimorfismo sexual não é muito evidente.

**Distribuição:** Distribui-se pela Europa, Ásia e África.

**Ameaças de conservação:** Não está ameaçado, pois é um animal muito rústico, embora a sua agressividade o inclua nos programas de "controle de predadores" da maior parte das Reservas de caça.